



Přírodní rezervace Dubno u České Skalice na Náchodsku je známou lokalitou, kterou proslavily vlhké orchidejové louky a přilehlé „lužní“ doubravy se staletými duby. Rezervace se vesměs rozkládá na místech zaniklé rozsáhlé rybniční soustavy. Zlíčský rybník ležící na jejím západním okraji je jediný, který se zachoval až do současnosti.

{jathumbnail off}

Rybník má za sebou poměrně zajímavou historii. Původně měl rozlohu přes 15 ha, ale v roce 1967 v souvislosti s budováním nedalekého přivaděče vody z Úpy do údolní nádrže Rozkoš, došlo k jeho úplnému zániku. To se samozřejmě velmi negativně projevilo na přilehlých slatinných loukách, které byly již tenkrát chráněny jako rezervace. Proto došlo v 80. letech k jeho částečnému znovuoobnovení (rybník má dnes přibližně ¼ původní rozlohy). Na mapě a leteckých snímcích lze vidět, jak se postupně měnila poloha i rozloha rybníka.

V roce 1866 zde proběhla jedna z nejkrvavějších bitev rakousko-pruské války – ještě dnes se v mohutných dubech dají nalézt olověné kulky a střepiny šrapnelů.

Fauvistické průzkumy na Zlíčském rybníku v 90. letech zaznamenaly výskyt pouze 10 nejběžnějších druhů vážek. Proto bylo poměrně překvapivé, když se zde předloni začaly objevovat poměrně vzácné druhy vesměs teplomilných vážek, které v naší přírodě představují neobvyklý tzv. mediteránní (středomořský) prvek. Výskyt těchto „jihoevropských“ druhů lze asi vysvětlit dvojím způsobem. Některé z těchto druhů se dnes šíří plošně díky oteplování – příkladem může být vážka červená (*Crocothemis erythraea*).

Výskyt dalších druhů jako např. vážky hnědoskvrnné (*Orthetrum brunneum*) či vážky

žlutoskvrnné (*Orthetrum coerulescens*) pak asi souvisí s poměrně razantním revitalizačním zásahem, který zde proběhl v roce 2010. Během tohoto zásahu, který měl za účel podpořit populaci ohrožené žáby kuňky obecné, zde byly vyhloubeny nové tůně a u rybníka došlo k stržení břehu s rákosem. Tyto druhy, které se pohybují v krajině po vhodných stanovištích a jsou schopny rychle osídlit nově vytvořené vodní plochy označujeme jako druhy tzv. „pionýrské“.

Asi největší místní raritou je vážka jarní (*Sympetrum fonscolombii*), která je na našem území považována spíše za vzácného migranta schopného se na vhodných lokalitách úspěšně množit. V roce 2012 zde létalo několik desítek kusů této vzácné vážky a pozoroval jsem páření i kladení vajíček. Celkem se mi podařilo na Zlíčském rybníku potvrdit výskyt osmi ohrožených druhů vážek, což činí z této lokality jednu z nejvýznamnějších náhodského okresu.

Seznam zjištěných "vzácnějších" druhů:

Anax parthenope (Sélys, 1839) – šídlo tmavé

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – klínatka rohatá

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) – vážka bělořitná

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – vážka hnědoskvrnná

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) – vážka žlutoskvrnná

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – vážka červená

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) – vážka jarní

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – šidélko malé

(Pozn. redakce: Jan Ježek je učitel přírodopisu a zeměpisu na Jiráskově gymnáziu v Náhodě. Ve volném čase se věnuje praktické ochraně přírody Náhodska, mapování a ochraně ohrožených druhů, organizaci brigád a osvětových akcí pro mládež i veřejnost. Od roku 2010 je členem náhodského zastupitelstva. Jan Ježek vydává internetový [server o krajině a přírodě východních Čech](#), odkud pochází tento příspěvek.)



.pagenavbar{z-index: 0;}



[zpět na článek](#)

.pagenavbar{z-index: 0;}






[página 1/2](#) index: 0;}



[página 1/2](#) index: 0;}



[página 1/2](#) index: 0;}



[página 1/2](#) index: 0;}



[zpět na článek](#)